

# LUGANO

fumarato de formoterol  
di-hidratado + propionato  
de fluticasona

## INSPIRAÇÃO PARA A VIDA FICAR MAIS LEVE\*

A solução única para tratar a asma  
com maior potência e rápida ação<sup>1,2</sup>

FORMULAÇÃO EXCLUSIVA E INOVADORA

### FLUTICASONA + FORMOTEROL<sup>2</sup>



**RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO**  
(1 a 3 minutos<sup>3</sup>)



**EFICÁCIA COMPARÁVEL À  
ASSOCIAÇÃO BUDESONIDA  
+ FORMOTEROL<sup>4</sup>**



**DISPOSITIVO EXCLUSIVO  
MAIOR PROTEÇÃO  
DAS CÁPSULAS.<sup>2</sup>**



**ACESSÍVEL E SEM  
BUROCRACIA<sup>5,6</sup>**



\*Refere-se à ação de inspirar o medicamento e ter maior controle da asma.<sup>1,4</sup>

Imagem meramente ilustrativa e não representa a ação ou ausência de utilização do medicamento.

Referências: 1. Anttila M, Castro F, Cruz A, et al. Eficácia e segurança da associação fluticasona/formoterol em cápsula única em pacientes com asma moderada persistente: um estudo randomizado, duplo-cego, de 12 semanas. J Bras Pneumol. 2017;43(3):159-160. 2. Bula do medicamento Lugano, registrado por Eurofarma Laboratórios S.A. 3. Sears MR, Lotvall J. Past, present and future — beta2-adrenoceptor agonists in asthma management. Respir Med. 2005 Feb;99(2):152-70. 4. Anttila M, Castro F, Cruz A, et al. Eficácia e segurança da associação fluticasona/formoterol em cápsula única em pacientes com asma persistente: estudo de não inferioridade. J Bras Pneumol. 2014;40(5):599-608. 5. KairosWeb Brasil, disponível em <https://br.kairosweb.com.br/flutiform/PMC118%>. Acessado em setembro/2025. 6. Portal do PBM, disponível em <https://www.portaldopbm.com.br/>

Lugano® (fumarato de formoterol di-hidratado + propionato de fluticasona) — Cápsula gelatinosa dura com pó para inalação 12 mcg + 250 mcg — USO INALATÓRIO ORAL — USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS —  
**INDICAÇÕES:** asma. **CONTRAINDICAÇÕES:** hipersensibilidade aos componentes da fórmula; menores de 12 anos. **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** acompanhamento com especialista; sintomas agudos; asma instável; contraindicado para uso no alívio de broncoespasmo agudo induzido pelo exercício; piora súbita; infecção fúngica, viral ou outras; hipertireoidismo; feocromocitoma; diabetes; hipocalcemia; cardiomiopatia; estenose aórtica; hipertensão; doenças cardiovasculares; prolongamento do intervalo QT; broncoespasmo paradoxal; supressão adrenal; síndrome de Cushing; diminuição da densidade óssea; glaucoma; catarata; lactação; monitorização da função hepática; outras. Categoria C de risco na gravidez. **CONTÉM LACTOSE.** **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** ritonavir; eritromicina; octoconazol; quinidina; procainamida; anti-histamínicos; IMAOs; tricíclicos; derivados xantínicos; esteroides; diuréticos; digitálicos; betabloqueadores; outros. **REAÇÕES ADVERSAS:** candidíase oral e faríngea; alterações no cortisol sérico; náusea; tremor; tontura; dor de cabeça; rouquidão; outras. **POSOLOGIA:** 1 cápsula inalatória VO 2x/dia. **PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, CONSULTE A BULA. M.S.: 1.0043.1173. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MATERIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AOS PROFISSIONAIS HABILITADOS A DISPENSAR OU PRESCREVER MEDICAMENTOS.** ame@eurofarma.com



Setembro/2025

**euofarma**  
sua vida move a nossa